

## Kokcydiostatyk

# Robenz<sup>®</sup> 66G

## Chlorowodorek robenidyny (66 g/kg)

Dodatek paszowy do podawania wraz z paszą dla zwierząt.

**Instrukcja stosowania:** Robenz<sup>®</sup> 66G jest stosowany w celu zapobiegania kokcydiozie wywołanej przez *Eimeria* spp. Do stosowania tylko u gatunków wymienionych poniżej.

| Numer identyfikacyjny   | Gatunek lub kategoria zwierząt | Chlorowodorek robenidyny mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej | Robenz <sup>®</sup> 66G g/tona mieszanki paszowej pełnoporcjowej | Inne postanowienia  |
|---|--------------------------------|--|--|---|
| 5a758   | Kurczęta rzeźne                | 36   | 550  | Stosowanie jest zabronione przez co najmniej 5 dni przed ubojem |
| Chlorowodorek robenidyny: CAS N° 25875-50-7; EC N°: 247-307-8 |                                |  |  |   |

## UWAGA

**Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:** Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

**Zwroty wskazujące środki ostrożności:** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/państwowymi/międzynarodowymi.

**Dodatkowe informacje dotyczące zagrożenia:** Może dochodzić do gromadzenia się łatwopalnych pyłów w powietrzu.

**Instrukcja sporządzania paszy:** Produkt powinien być dodawany do paszy po uprzednim sporządzeniu przedmieszki. Należy dokładnie wyczyścić wszystkie urządzenia służące do przygotowania paszy przed sporządzeniem innej paszy/premiks.

**Warunki przechowywania i trwałości:** Przechowywać w chłodnym (najlepiej w temperaturze poniżej 25°C), suchym miejscu, chronić przed światłem. Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Należy dokładnie zamknąć opakowanie po użyciu. Robenz<sup>®</sup> 66G może być przechowywany przez 36 miesięcy w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Robenz<sup>®</sup> 66G zachowuje trwałość do 12 miesięcy w premiksach oraz 3 miesięcy w paszy pełnoporcjowej, o ile są przechowywane w suchym pomieszczeniu, w temperaturze poniżej 25°C.

**Ostrzeżenia i przeciwwskazania:** Chlorowodorek robenidyny nie może być mieszany z innymi kokcydiostatykami. Dla bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem należy chronić drogi oddechowe oraz używać okularów i rękawic ochronnych.

Zoetis Belgium SA  
Mercuriusstraat 20  
1930 Zaventem  
BELGIA  
aBE101766

Data ważności: patrz "Expiry date" na etykiecie wielojęzycznej  
Data produkcji: patrz "Manufacturing date" na etykiecie wielojęzycznej  
Numer serii: patrz "Lot number" na etykiecie wielojęzycznej  
Masa netto: patrz "Net weight" na etykiecie wielojęzycznej

zoetis

PL AHZ 1021 2007

