INFEKCJE WIRUSOWE

WITNESS® FeLV/FIV

NOWOŚĆ! Teraz 2 i 5 testów w opakowaniu

Cel	Wykrycie antygenu wirusa białaczki kotów / Wykrycie przeciwciał przeciw wirusowi niedoboru immunologicznego kotów			
Zalecane stosowanie	**Koty zdrowe:** - **kocięta:** podczas pierwszej wizyty u lekarza weterynarii - **koty dorosłe:** przed szczepieniem przeciwko zakażeniom wirusem FeLV, koty narażone na ekspozycję; coroczne kontrole stanu zdrowia		**Koty chore:** - podejrzenie infekcji FeLV-FIV niezależnie od wieku, ujemnego wyniku poprzedniego testu lub wcześniejszego szczepienia	
Próbka	Krew pełna z antykoagulantem (EDTA, heparyna), surowica lub osocze			
Trafność testu	Czułość	99%[1]	Swoistość	99.3%[1]
Wielkość opakowań	FeLV-FIV Combo: 2 lub 5 testów w pudełku			

JAK STOSOWAĆ?

1 **1 kropla** próbki:
krew pełna z antykoagulantem (EDTA, heparyna), surowica lub osocze



2 **3 krople** roztworu buforowego



Odczyt i interpretacja wyniku*: po 10 minutach

TEST WAŻNY

Wynik dodatni

LUB

Wynik ujemny

TEST NIEWAŻNY

Test wadliwy

LUB

Test wadliwy

* Wszystkie wyniki testu należy interpretować na tle kontekstu klinicznego (dane z wywiadu chorobowego i wyniki badania lekarskiego) oraz z uwzględnieniem wiedzy o patogenezie choroby

UWAGI

- **Dodatnie wyniki testu FeLV powinny zostać potwierdzone, zwłaszcza u kotów nie wykazujących objawów choroby i kotów, u których ryzyko zakażenia jest wysokie (wysoka prewalencja), po 3 miesiącach.**
- U kociąt test można wykonywać w każdym wieku.
- Szczepienia oraz przeciwciała matczyne nie wpływają na wyniki testów na obecność antygenu wirusa FeLV.
- Przeciwciała anty-FIV, które zakażona matka przekazała wraz z siarą swoim młodym, mogą być przyczyną dodatniego wyniku testu u kociąt.

U kociąt, które mają dodatni wynik testu w kierunku FIV, należy ponownie przeprowadzić test po 3 miesiącach. Jeżeli wynik dodatni zostanie potwierdzony u kociąt w wieku powyżej 6 miesięcy, kocięta te uznaje się za zakażone.

- Dodatnie wyniki testu powinny zostać potwierdzone, zwłaszcza u kotów nie wykazujących objawów choroby i kotów, u których ryzyko zakażenia jest niewielkie (niska prewalencja).

1- Robinson A, et al. Comparison of a rapid immunomigration test and ELISA for FIV antibody and FeLV antigen testing in cats. Veterinary Record 1998;142:491-492.

NOWA, NIŻSZA CENA!

Testy **DIAGNOSTYCZNE** WITNESS®

Obszar terapeutyczny	Cel	Nazwa testu	Liczba testów w opakowaniu
Infekcje wirusowe	Antygeny parwowirozy	WITNESS® Parvo	5
Infekcje wirusowe	Antygeny / przeciwciała wirusa białaczki kociej FeLV/ wirusa FIV	WITNESS® FeLV-FIV	2 lub 5
Rozród	Hormon luteinizujący (LH)	WITNESS® LH	6
	Hormon relaksyna (RLX)	WITNESS® Relaxin	5
Infekcje pasożytnicze	Giardia intestinalis	WITNESS® Giardia	5

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Gotowe do użycia

Mała objętość próbki

Prosta procedura w 2 krokach*

Szybki wynik po 10 min*

* W zależności od testu

Testy **DIAGNOSTYCZNE**

zoetis

Zoetis Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa
tel. +48 22 335 61 01 (do 03), www.zoetis.com