



Stosuj  
**Pełne leczenie**  
Jedną dawką



**Zwiększ szansę przeżycia prosiąt –  
wcześniej wykrywając i prosząc lekarza weterynarii  
o leczenie zakażenia *Streptococcus suis*.**

Niektóre świnie są bardziej niż pozostałe narażone na rozwój streptokokozы.

Które grupy wiekowe są szczególnie podatne na rozwój zakażenia?

- Prosięta w pierwszych 3 do 4 tygodni życia (prosięta ssące)
- Prosięta w wieku 6-10 tygodni (okres po odsadzeniu)

Chcąc rozpoznać streptokokozę w porę, zanim będzie za późno, należy często i starannie obserwować prosięta, zwracając uwagę na wczesne objawy zakażenia *Streptococcus suis*.

Prosięta ssące należy obserwować dwa razy dziennie.

Prosięta odsadzone należy obserwować raz dziennie.



Wczesne rozpoznanie zakażenia *Streptococcus suis* oznacza skuteczniejsze leczenie.

## Etap 1

Rozpoznanie wczesnych objawów zakażenia *Streptococcus suis* u prosiąt:

- Przekrzywiona głowa, oklapnięte uszy.
- Apatia, odstawanie od grupy pozostałych zwierząt.
- Kulawizna z lub bez obrzmienia okolic stawów.

## Etap 2

Jeśli wczesne objawy zakażenia *Streptococcus suis* zostały rozpoznane, dokładniejsze badanie ma znaczenie decydujące:

- Należy sprawdzić, czy wewnętrzna ciepłota ciała przekracza 39,5°C.
- Należy zbadać stawy pod kątem jakichkolwiek oznak obrzęku.

Jeśli objawy streptokokozы zostały potwierdzone, poproś lekarza weterynarii o wczesne, skuteczne leczenie jedną iniekcją długo działającym antybiotykiem, który zwiększy odsetek przeżywalności prosiąt.



# Poproś lekarza weterynarii o wczesną terapię zakażeń *Streptococcus suis*, która zapewni ci dodatkowe korzyści:

- Pełna terapia jedną iniekcją – kompletne przestrzeganie zaleceń terapeutycznych.

Leczenie przy pomocy tylko 1 iniekcji działającej przez 7 dni jest znacznie wygodniejsze i oszczędza czas niż stosowanie krótko działającego antybiotyku w iniekcji przez kilka dni. Hodowca ma pewniejsze rezultaty leczenia z powodu uniknięcia błędów zdarzających się przy podawaniu leków. Najczęstszymi błędami są: pominięcie niektórych świń przy kolejnych dawkach leku, podanie antybiotyku w nieodpowiednim czasie, podanie mniejszej liczby iniekcji niż zalecenia lekarza weterynarii.

- Szybkie działanie – szybszy powrót do zdrowia.

Szybkość, z jaką działa antybiotyk ma kolosalne znaczenie dla chorych zwierząt, ponieważ umożliwia ona natychmiastowe leczenie i szybkie zwalczenie zakażenia. Szybszy powrót do zdrowia to mniejsze straty w produkcji.

- Długie działanie – mniej nawrotów choroby.

Liczba dni, przez które lek działa w organizmie zwierzęcia jest jego istotną cechą, ponieważ im dłużej on zabezpiecza przed reinfekcją, tym mniejsza jest szansa na powtórne zachorowanie, które obniżają zysk z hodowli.



Stosuj  
**Pełne leczenie**  
Jedną dawką




## Jakie są korzyści ze stosowania długodziałającego antybiotyku jednokrotnego podania?

- Skuteczność leczenia.
- Tylko jednokrotne wyłapywanie zwierząt – mniejsze nakłady pracy.
- Pewność podania odpowiedniej dawki leku – brak pomyłek – pewność wyleczenia.

### Wygoda jednego podania


Długodziałający antybiotyk jednokrotnego podania jest skuteczny przez co najmniej 7 dni



Żeby zastąpić efekt działania długodziałającego antybiotyku jednokrotnego podania, antybiotykiem wielokrotnego podania – trzeba podać aż 7 iniekcji.

### Pewny efekt leczenia

Długodziałający antybiotyk jednokrotnego podania jest skuteczny przez co najmniej 7 dni



Antybiotyk działający nawet przez 2 dni, podawany nieregularnie nie zastąpi efektu leczniczego długodziałającego antybiotyku jednokrotnego podania – ze względu na powstanie luki w działaniu.

# Wczesne i wygodne leczenie, któremu możesz zaufać.



Stosuj  
**Pełne leczenie**  
Jedną dawką

W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z Twoim lekarzem weterynarii

DLA ZWIERZĄT. DLA ZDROWIA. DLA CIEBIE.

**zoetis**<sup>™</sup>